



Konsummuster und Teilhabebedarfe in der stationären
Entwöhnungsbehandlung im Zeitverlauf:
Eine altersspezifische Betrachtung
Sonderauswertung zur FVS-Katamnese der
Entlassjahrgänge 2012 bis 2016 von
Fachkliniken für Alkohol- und Medikamentenabhängige

Rudolf Bachmeier, Leitung Qualitäts- und Prozessmanagement, Johannesbad Gruppe, Bad Füssing

Dr. Volker Weissinger, Geschäftsführer Fachverband Sucht e.V., Bonn

Deutscher Suchtkongress, Mainz 16. September 2019



Agenda

- Einleitung
- Methode
 - Datengrundlage
 - Standards der Fachverband Sucht Katamnesen
 - Beschreibung der Stichprobe
- Ergebnisse
- Zusammenfassung
- Schlussfolgerung

Erklärung zu möglichen Interessenskonflikten:

Der Erstautor ist im Bereich Qualitäts- und Prozessmanagement bei der Johannesbad Gruppe beschäftigt. Zur Johannesbad Gruppe gehören neben Hotels und Gesundheitseinrichtungen im Bereich der Orthopädie, Urologie und Psychosomatik auch drei Kliniken des Indikationsbereichs Abhängigkeitserkrankungen. Zudem ist der Erstautor Mitglied im Ausschuss „Statistik und Dokumentation“ des Fachverbandes Sucht e.V.

1. Einleitung

Zielsetzung:

- Zielsetzung der Untersuchung ist eine altersspezifische Betrachtung der Konsummuster und Teilhabebedarfe im zeitlichen Verlauf von fünf Jahren

Vorgehensweise:

- Altersspezifische Betrachtung der Katamnese-Daten durch Bildung von drei Altersgruppen: bis unter 30 Jahren, 30 bis unter 55 Jahre und 55 Jahre und älter
- Datenbasis: Patienten mit Suchtmitteldiagnose, die sich in einer stationären Rehabilitationsbehandlung in Fachkliniken für Alkohol- und Medikamentenabhängige befanden

2. Methode

Datengrundlage:

- Basisdokumentations- und Katamnesedaten aus Mitgliedseinrichtungen des Fachverbandes Sucht e.V.
- Totalerhebungen der Entlassjahrgänge 2012 bis 2016

Standards der Fachverband Sucht Katamnesen

- Ein-Jahreskatamnesen (jährliche Totalerhebungen)
orientiert an den Standards zur Durchführung von Katamnesen der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie
- Erhebungsinstrumente Basisdokumentation und Katamnese Sucht
(gemäß Deutscher Kerndatensatz, DHS 2008)
- Postalische (ggf. zusätzlich telefonische) Erhebung der Katamnese
im Rahmen eines gleitenden Versandschemas jeweils 12 Monate nach Behandlungsende
- Therapieerfolgsbewertung: abstinent, abstinent nach Rückfall, rückfällig

2. Methode

Beschreibung der Stichprobe I:

- Entlassungsjahrgänge 2012 bis 2016 mit Stichprobengröße N = 59.134
- überwiegend Männer (Anteil von 70,7%)
- 54,3% ohne feste Beziehung
- 40,8% erwerbstätig, 42,2% erwerbslos
- Alkohol mit 91,6% häufigste Hauptsuchtdiagnose
- Hohe Quote planmäßiger Behandlungsbeendigungen mit 86,1%

Merkmal	Kategorie	Gesamt 2012-2016 N = 59.134
Geschlecht	männlich	70,7%
	weiblich	29,3%
Partnerbeziehung	feste Beziehung	45,7%
	keine feste Beziehung	54,3%
Erwerbstätigkeit bei Aufnahme	erwerbstätig	40,8%
	erwerbslos	42,2%
	nicht erwerbstätig	17,0%
Hauptsuchtdiagnose	Alkohol	91,6%
	Opioide	0,8%
	Cannabinoide	2,9%
	Sedativa/Hypnotika	1,4%
	sonstige	3,2%
Art der Behandlungsbeendigung	planmäßig	86,1%
	nicht planmäßig	13,7%

2. Methode

Beschreibung der Stichprobe II:

- Patienten bei Aufnahme durchschnittlich
 - 46,1 Jahre alt
 - 14,9 Jahre abhängig
- Durchschnittliche Anzahl Diagnosen pro Patient
 - 0,36 Suchtnebendiagnosen
 - 0,65 psychische Diagnosen
 - 1,95 somatische Diagnosen
- Durchschnittliche Dauer der Behandlung in Tagen
 - 79,5 Tage bei allen Patienten
 - 85,4 Tage bei planmäßig entlassenen Patienten

Merkmal	Gesamt 2012-2016 N = 59.134	
	Ø	Stand.-Abw.
Alter bei Aufnahme in Jahren	46,1	11,3
Abhängigkeitsdauer in Jahren	14,9	10,1
Suchtnebendiagnosen (Anzahl pro Patient)	0,36	0,85
Psychische Komorbidität (Anzahl pro Patient)	0,65	0,80
Somatische Komorbidität (Anzahl pro Patient)	1,95	1,40
Behandlungsdauer in Tagen	79,5	32,2
Behandlungsdauer bei planmäßiger Entlassung in Tagen	85,4	28,0

3. Ergebnisse

Datenrücklauf und Therapieerfolgsquoten

Ergebnisse zum Datenrücklauf	Gesamt 2012-2016 N = 59.134
Abstinent	30,3%
Abstinent nach Rückfall	10,1%
Rückfällig	13,0%
Widersprüchliche Information	0,3%
Verweigert	1,5%
Verstorben	1,0%
Unbekannt verzogen	14,1%
Unfähig zur Beantwortung	0,3%
Sonstiges/Nichtantworte	29,4%

Katamneseantworte
N = 31.719 (53,6%)

Katamnese-Nichtantworte
N = 27.415 (46,4%)

=> Katamnestische Therapieerfolgsquote

- DGSS 3 (Katamneseantworte), N = 31.719: **75,2%**
- DGSS 4 (alle Entlassungen, Nichtantworte werden als Rückfällig eingestuft), N = 59.134: **40,3%**

3. Ergebnisse

Verteilung der Altersgruppen

- Über alle Jahrgänge Quote der Altersgruppe
 - **30 bis 55 Jahre** mit durchschnittlich 67,3% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 9,8% am **geringsten**

Altersgruppe	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	9,7%	10,1%	9,6%	10,0%	9,5%	9,8%
30 bis unter 55 Jahre	69,0%	68,6%	67,5%	65,5%	65,2%	67,3%
55 Jahre und älter	21,3%	21,3%	23,0%	24,6%	25,3%	23,0%

Geschlecht vs. Alter

- Quote männlicher Patienten über alle Jahrgänge in der Altersgruppe
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 76,8% am **höchsten**
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 67,3% am **geringsten**

Altersgruppe	Geschlecht	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	Männer	76,0%	75,8%	76,2%	77,8%	78,7%	76,8%
	Frauen	24,0%	24,2%	23,8%	22,2%	21,3%	23,2%
30 bis unter 55 Jahre	Männer	70,7%	70,5%	70,4%	71,7%	71,9%	71,0%
	Frauen	29,3%	29,5%	29,6%	28,3%	28,1%	29,0%
55 Jahre und älter	Männer	67,8%	67,1%	65,8%	67,6%	68,2%	67,3%
	Frauen	32,2%	32,9%	34,2%	32,4%	31,8%	32,7%
Gesamt	Männer	70,6%	70,3%	69,9%	71,3%	71,6%	70,7%
	Frauen	29,4%	29,7%	30,1%	28,7%	28,4%	29,3%

3. Ergebnisse

Partnerbeziehung vs. Alter

- Quote Patienten mit fester Beziehung über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 52,7% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 30,7% am **geringsten**

Altersgruppe	Partnerbeziehung	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	feste Beziehung	32,9%	31,2%	31,9%	30,8%	26,3%	30,7%
	keine feste Beziehung	67,1%	68,8%	68,1%	69,2%	73,7%	69,3%
30 bis unter 55 Jahre	feste Beziehung	47,7%	44,2%	45,6%	45,5%	44,5%	45,6%
	keine feste Beziehung	52,3%	55,8%	54,4%	54,5%	55,5%	54,4%
55 Jahre und älter	feste Beziehung	55,7%	52,4%	54,2%	50,2%	50,9%	52,7%
	keine feste Beziehung	44,3%	47,6%	45,8%	49,8%	49,1%	47,3%
Gesamt	feste Beziehung	47,9%	44,7%	46,2%	45,2%	44,4%	45,7%
	keine feste Beziehung	52,1%	55,3%	53,8%	54,8%	55,6%	54,3%

3. Ergebnisse

Berufliche Integration vs. Alter

- Quote arbeitsloser Patienten über alle Jahrgänge in der Altersgruppe
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 59,9% am **höchsten**
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 23,5% am **geringsten**

- Quote für nicht erwerbstätige Patienten über alle Jahrgängen in der Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 38,4% am **höchsten**

Altersgruppe	Berufliche Situation	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	erwerbstätig	25,7%	27,0%	27,5%	31,2%	29,8%	28,1%
	arbeitslos	61,4%	62,9%	63,2%	56,8%	54,1%	59,9%
	nicht erwerbstätig	13,0%	10,1%	9,3%	12,0%	16,1%	12,1%
30 bis unter 55 Jahre	erwerbstätig	44,3%	43,3%	43,4%	43,7%	42,9%	43,5%
	arbeitslos	44,6%	47,1%	46,3%	47,3%	45,5%	46,1%
	nicht erwerbstätig	11,1%	9,6%	10,3%	8,9%	11,6%	10,3%
55 Jahre und älter	erwerbstätig	36,6%	37,6%	39,1%	39,1%	38,1%	38,0%
	arbeitslos	23,3%	24,1%	24,0%	23,1%	23,1%	23,5%
	nicht erwerbstätig	40,1%	38,3%	36,9%	37,8%	38,7%	38,4%
Gesamt	erwerbstätig	40,8%	40,4%	40,9%	41,4%	40,5%	40,8%
	arbeitslos	41,7%	43,8%	42,8%	42,3%	40,6%	42,2%
	nicht erwerbstätig	17,5%	15,8%	16,3%	16,3%	18,9%	17,0%

3. Ergebnisse

Hauptdiagnose vs. Alter

- Quote von Patienten mit Hauptdiagnose Alkohol über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** und **30 bis 55 Jahre** mit durchschnittlich 97,1% und 93,5% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 65,8% am **geringsten**

- Quoten von Patienten mit Hauptdiagnosen Cannabis und sonstige Suchtdiagnosen über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 17,6% und 14,3% deutlich **höher** besetzt als bei anderen Altersgruppen

Altersgruppe	Hauptdiagnose	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	Alkohol	67,8%	65,9%	70,2%	63,2%	61,5%	65,8%
	Opioide	1,1%	1,1%	0,9%	0,9%	1,4%	1,1%
	Cannabis	14,8%	15,3%	15,5%	22,6%	20,7%	17,6%
	Sedativa, Hypnotika	1,5%	1,1%	1,0%	1,0%	1,5%	1,2%
	sonstige	14,8%	16,6%	12,4%	12,3%	14,9%	14,3%
30 bis unter 55 Jahre	Alkohol	94,1%	94,0%	94,2%	92,4%	92,3%	93,5%
	Opioide	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%
	Cannabis	1,2%	1,5%	1,7%	2,4%	2,1%	1,7%
	Sedativa, Hypnotika	1,4%	1,3%	1,3%	1,1%	1,4%	1,3%
	sonstige	2,4%	2,4%	1,9%	3,1%	3,4%	2,6%
55 Jahre und älter	Alkohol	97,0%	97,4%	96,8%	96,8%	97,3%	97,1%
	Opioide	0,4%	0,7%	0,4%	0,8%	0,6%	0,6%
	Cannabis	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
	Sedativa, Hypnotika	2,1%	1,6%	2,1%	2,1%	1,8%	1,9%
	sonstige	0,4%	0,2%	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%
Gesamt	Alkohol	92,2%	91,9%	92,5%	90,5%	90,6%	91,6%
	Opioide	0,8%	0,8%	0,8%	1,0%	0,8%	0,8%
	Cannabis	2,3%	2,6%	2,6%	3,9%	3,4%	2,9%
	Sedativa, Hypnotika	1,6%	1,3%	1,4%	1,3%	1,5%	1,4%
	sonstige	3,1%	3,4%	2,7%	3,3%	3,7%	3,3%

3. Ergebnisse

Komorbidity vs. Alter

- Quote von Patienten mit Suchtnebendiagnosen über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 0,96 Diagnosen/Patient am **höchsten**
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 0,11 Diagnosen/Patient am **geringsten**
- Quote von Patienten mit psych. Komorbidity über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 0,72 Diagnosen/Patient am **höchsten**
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 0,56 Diagnosen/Patient am **geringsten**
- Quote von Patienten mit som. Komorbidity über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 2,48 Diagnosen/Patient am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 0,9 Diagnosen/Patient am **geringsten**

Altersgruppe	Komorbidity durchschnittliche Anzahl an Diagnosen	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	Suchtnebendiagnosen	0,88	0,94	1,11	0,94	0,97	0,96
	psychische Komorbidity	0,58	0,82	0,77	0,73	0,73	0,72
	somatische Komorbidity	0,86	0,95	0,94	0,82	0,84	0,90
30 bis unter 55 Jahre	Suchtnebendiagnosen	0,28	0,33	0,41	0,40	0,41	0,36
	psychische Komorbidity	0,57	0,63	0,75	0,73	0,72	0,67
	somatische Komorbidity	1,82	1,90	2,08	1,93	1,84	1,93
55 Jahre und älter	Suchtnebendiagnosen	0,11	0,11	0,13	0,09	0,11	0,11
	psychische Komorbidity	0,50	0,53	0,63	0,58	0,56	0,56
	somatische Komorbidity	2,34	2,48	2,60	2,51	2,41	2,48
Gesamt	Suchtnebendiagnosen	0,30	0,34	0,42	0,38	0,39	0,36
	psychische Komorbidity	0,55	0,63	0,73	0,69	0,68	0,65
	somatische Komorbidity	1,84	1,93	2,10	1,96	1,89	1,95

3. Ergebnisse

Vorbehandlung vs. Alter

- Quote von Patienten ohne bisherige Entzugsbehandlung über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 24,9% am **höchsten**
 - **30 bis unter 55 Jahre** und **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 19,1% und 20,0% am **geringsten**
- Quote von Patienten mit mehr als einer Entzugsbehandlung über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **30 bis 55 Jahre** mit durchschnittlich 50,5% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 41,6% am **geringsten**

Altersgruppe	Entzugsbehandlungen	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	bislang keine	24,5%	23,4%	23,8%	24,7%	28,1%	24,9%
	bislang eine	33,1%	34,1%	32,9%	36,2%	31,4%	33,5%
	mehr als eine	42,4%	42,5%	43,2%	39,0%	40,6%	41,6%
30 bis unter 55 Jahre	bislang keine	18,3%	17,3%	19,3%	20,1%	21,2%	19,1%
	bislang eine	32,5%	31,7%	29,2%	29,0%	27,9%	30,3%
	mehr als eine	49,2%	50,9%	51,5%	50,9%	50,9%	50,6%
55 Jahre und älter	bislang keine	17,9%	18,2%	21,5%	20,5%	21,9%	20,0%
	bislang eine	35,4%	34,3%	31,6%	31,4%	31,6%	32,9%
	mehr als eine	46,7%	47,5%	46,9%	48,1%	46,5%	47,1%
Gesamt	bislang keine	18,8%	18,1%	20,2%	20,6%	22,0%	19,9%
	bislang eine	33,2%	32,5%	30,1%	30,3%	29,2%	31,2%
	mehr als eine	48,0%	49,4%	49,7%	49,0%	48,8%	49,0%

3. Ergebnisse

Therapiebeendigung vs. Alter

- Quote von Patienten mit planmäßiger Therapiebeendigung über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 90,4% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 74,7% am **geringsten**

Altersgruppe	Therapiebeendigung	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	planmäßig	71,6%	74,2%	76,6%	75,1%	76,4%	74,7%
	nicht planmäßig	28,4%	25,8%	23,4%	24,9%	23,6%	25,3%
30 bis unter 55 Jahre	planmäßig	86,0%	86,0%	87,1%	86,4%	86,0%	86,3%
	nicht planmäßig	14,0%	14,0%	12,9%	13,6%	14,0%	13,7%
55 Jahre und älter	planmäßig	90,8%	89,9%	91,2%	89,9%	90,3%	90,4%
	nicht planmäßig	9,2%	10,1%	8,8%	10,1%	9,7%	9,6%
Gesamt	planmäßig	85,6%	85,7%	87,1%	86,1%	86,2%	86,1%
	nicht planmäßig	14,4%	14,3%	12,9%	13,9%	13,8%	13,9%

3. Ergebnisse

Behandlungsdauer vs. Alter

- Durchschnittliche Behandlungsdauer über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 81,3 Tagen* und 93,8 Tagen für alle Entlassungen und planmäßige Entlassungen am **längsten**
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 75,2 Tagen und 79,0 Tagen für alle Entlassungen und planmäßige Entlassungen am **kürzesten**

	durchschnittliche Behandlungsdauer in Tagen alle Entlassungen					
Altersgruppe	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	82,7	81,2	80,1	79,9	82,0	81,3
30 bis unter 55 Jahre	80,7	80,3	80,9	81,0	81,2	80,8
55 Jahre und älter	75,6	74,4	75,0	75,4	75,6	75,2
Gesamt	79,8	79,1	79,5	79,5	79,9	79,5

	durchschnittliche Behandlungsdauer in Tagen bei planmäßigen Entlassungen					
Altersgruppe	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	95,9	92,5	92,9	93,6	93,6	93,8
30 bis unter 55 Jahre	86,5	86,0	86,5	87,0	87,0	86,7
55 Jahre und älter	79,2	78,2	78,6	79,6	79,6	79,0
Gesamt	85,6	84,8	85,1	85,7	85,7	85,4

* mit Ausnahme des Entlassjahrgangs 2014 (2015) mit einer Behandlungsdauer von 80,1 (79,9) Tagen bei bis 30jährige Patienten und 80,9 (81,0) Tagen bei 30 bis 55jährige Patienten

3. Ergebnisse

Katamneseteilnahme vs. Alter

- Katamneseantworterquote über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 66,1% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 34,4% am **geringsten**

Altersgruppe	Katamneseeteilnahme	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	Antworter	34,4%	33,5%	35,6%	33,5%	35,3%	34,4%
	Nichtantworter	65,6%	66,5%	64,4%	66,5%	64,7%	65,6%
30 bis unter 55 Jahre	Antworter	54,6%	53,7%	52,8%	50,1%	48,8%	52,2%
	Nichtantworter	45,4%	46,3%	47,2%	49,9%	51,2%	47,8%
55 Jahre und älter	Antworter	67,6%	66,1%	66,9%	64,6%	65,0%	66,1%
	Nichtantworter	32,4%	33,9%	33,1%	35,4%	35,0%	33,9%
Gesamt	Antworter	55,5%	54,3%	54,4%	52,0%	51,6%	53,6%
	Nichtantworter	44,5%	45,7%	45,6%	48,0%	48,4%	46,4%

3. Ergebnisse

Therapieerfolg (DGSS 3) vs. Alter

- Therapieerfolgsquote nach DGSS 3 (alle Antwortter) über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 79,3% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 66,4% am **geringsten**

Altersgruppe	Therapieerfolg DGSS 3	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	erfolgreich	63,0%	66,5%	64,9%	72,8%	65,7%	66,4%
	nicht erfolgreich	37,0%	33,5%	35,1%	27,2%	34,3%	33,6%
30 bis unter 55 Jahre	erfolgreich	74,6%	74,8%	74,4%	73,8%	73,5%	74,3%
	nicht erfolgreich	25,4%	25,2%	25,6%	26,2%	26,5%	25,7%
55 Jahre und älter	erfolgreich	79,5%	79,1%	79,7%	79,6%	78,9%	79,3%
	nicht erfolgreich	20,5%	20,9%	20,3%	20,4%	21,1%	20,7%
Gesamt	erfolgreich	75,1%	75,4%	75,3%	75,5%	74,7%	75,2%
	nicht erfolgreich	24,9%	24,6%	24,7%	24,5%	25,3%	24,8%

3. Ergebnisse

Therapieerfolg (DGSS 4) vs. Alter

- Therapieerfolgsquote nach DGSS 4 (alle Entlassungen) über alle Jahrgänge in Altersgruppe
 - **55 Jahre und älter** mit durchschnittlich 52,4% am **höchsten**
 - **bis unter 30 Jahre** mit durchschnittlich 22,9% am **geringsten**

Altersgruppe	Therapieerfolg DGSS 4	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
bis unter 30 Jahre	erfolgreich	21,7%	22,3%	23,1%	24,4%	23,2%	22,9%
	nicht erfolgreich	78,3%	77,7%	76,9%	75,6%	76,8%	77,1%
30 bis unter 55 Jahre	erfolgreich	40,7%	40,1%	39,2%	36,9%	35,9%	38,8%
	nicht erfolgreich	59,3%	59,9%	60,8%	63,1%	64,1%	61,2%
55 Jahre und älter	erfolgreich	53,7%	52,3%	53,3%	51,4%	51,3%	52,4%
	nicht erfolgreich	46,3%	47,7%	46,7%	48,6%	48,7%	47,6%
Gesamt	erfolgreich	41,7%	40,9%	40,9%	39,2%	38,5%	40,3%
	nicht erfolgreich	58,3%	59,1%	59,1%	60,8%	61,5%	59,7%

4. Zusammenfassung I

Über alle Entlassjahrgänge

- sinkt die Quote männlicher Patienten mit zunehmenden Alter
- steigt die Quote von Patienten mit fester Beziehung mit zunehmenden Alter an
- sind jüngere Patienten der Altersgruppe bis unter 30 Jahre häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen und ältere Patienten der Altersgruppe 55 Jahre und älter häufiger nicht erwerbstätig
- ist Alkohol in der Altersgruppe 55 Jahre und älter beinahe die alleinige Hauptdiagnose während bei jüngeren Patienten der Altersgruppe bis unter 30 Jahre neben Alkohol auch Cannabis und sonstige Suchtdiagnosen häufig kodiert sind
- haben jüngere Patienten der Altersgruppe bis unter 30 Jahre neben der Hauptdiagnose häufiger Suchtnebendiagnosen während ältere Patienten im größeren Umfang somatische Diagnosen aufweisen

4. Zusammenfassung II

Über alle Entlassjahrgänge

- haben jüngere Patienten der Altersgruppe bis unter 30 Jahre im geringeren Umfang Therapieerfahrung in Form von Entzugsbehandlungen als ältere Patienten
- beenden ältere Patienten die Therapie häufiger planmäßig als jüngere Patienten
- sinkt die Behandlungsdauer mit zunehmenden Alter, sowohl bezogen auf alle Entlassungen* als auch auf planmäßige Entlassungen
- steigt die Katamnese-Teilnahmequote mit zunehmenden Alter an
- steigt die Therapieerfolgsquote nach DGSS 3 (Antworter) und DGSS 4 (alle Entlassungen) mit zunehmenden Alter an

* mit Ausnahme des Entlassjahrgangs 2014 (2015) mit einer Behandlungsdauer von 80,1 (79,9) Tagen bei bis 30jährige Patienten und 80,9 (81,0) Tagen bei 30 bis 55jährige Patienten

5. Folgerungen

- Das Patientenalter hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Therapieerfolg
- Im Rahmen der Behandlung ist es daher erforderlich, individuell auf die spezifischen Erfordernisse jüngerer Patienten mit einem deutlich unterschiedlichem komorbiden Störungsbild einzugehen
- Die dargestellten Daten beruhen auf bivariate Analysen. Komplexere Zusammenhänge wie z.B. das gleichzeitige Zusammenspiel mehrerer Variablen sowie der Einfluss weiterer Faktoren auf den Therapieerfolg wurden noch nicht untersucht
=> Dies bleibt weiteren Analysen vorbehalten
- Insgesamt zeigt die Sonderauswertung jedoch eine hohe Wirksamkeit der stationären Rehabilitation Abhängigkeitskranker über die fünf untersuchten Jahrgänge hinweg



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rudolf Bachmeier

Leitung Qualitäts- und Prozessmanagement
Johannesbad Holding SE & Co.KG

Johannesstraße 2
94072 Bad Füssing

eMail: rudolf.bachmeier@johannesbad.com